

# 2023: Vacunas recomendadas para los niños desde los 7 hasta los 18 años



**CLAVE**

Indica cuándo la vacuna se recomienda para todas las personas, salvo que el médico le diga que su hijo no puede recibir la vacuna de forma segura.

Indica que la serie de vacunas puede comenzarse a esta edad.

Indica que la vacuna se debe administrar si la persona se está poniendo al día con vacunas saltadas. No es necesario volver a iniciar una serie de vacunas, independientemente de la cantidad de tiempo que haya pasado entre las dosis.

Indica que las personas que no estén en mayor riesgo pueden vacunarse si lo desean después de hablar con un médico.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

- Si su hijo se saltó una vacuna recomendada para su edad, hable con el médico de su hijo lo antes posible para ver cuándo se la pueden administrar.
- Si su hijo tiene una afección que lo pone en riesgo de infección, o va a viajar afuera de los Estados Unidos, hable con el médico de su hijo sobre las vacunas adicionales que podría necesitar.

**Hable con el médico de su hijo si tiene preguntas sobre cualquiera de las vacunas recomendadas para su hijo.**

| VACUNAS RECOMENDADAS   | 7 AÑOS                               | 8 AÑOS | 9 AÑOS                       | 10 AÑOS | 11 AÑOS | 12 AÑOS | 13 AÑOS | 14 AÑOS | 15 AÑOS | 16 AÑOS | 17 AÑOS | 18 AÑOS |         |  |
|--|--------------------------------------|--------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| <b>Vacuna contra el COVID-19*</b> Enfermedad del coronavirus 2019  | COVID-19*                            |        |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>Vacuna contra la influenza**</b> Influenza (gripe)  | Influenza (una o dos dosis al año)** |        | Influenza (una dosis al año) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>Vacuna Tdap</b> Tétanos, difteria y tosferina   |                                      |        |                              |         | Tdap    |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>Vacuna contra el VPH†</b> Virus del papiloma humano   |                                      |        |                              | VPH†    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>Vacuna MenACWY</b> Enfermedad meningocócica   |                                      |        |                              |         |         | MenACWY |         |         |         |         |         |         | MenACWY |  |
| <b>Vacuna MenB</b> Enfermedad meningocócica  |                                      |        |                              |         |         |         |         |         |         |         | MenB    |         |         |  |
| <b>PONERSE AL DÍA CON LAS VACUNAS INFANTILES DE RUTINA SALTADAS*</b>   |                                      |        |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>Vacuna MMR</b> Sarampión, paperas y rubéola   | MMR                                  |        |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>Vacuna contra la varicela</b> Varicela  | Varicela                             |        |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>Vacuna HepA</b> Hepatitis A   | HepA                                 |        |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>Vacuna HepB</b> Hepatitis B   | HepB                                 |        |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>Vacuna IPV</b> Poliomielitis  | IPV                                  |        |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>SOLO EN LOS LUGARES DONDE EL DENGUE SEA COMÚN: DEBE hacerse un análisis de laboratorio para confirmar infección previa por dengue</b> |                                      |        |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |
| <b>Vacuna contra el dengue</b> Dengue  | Dengue                               |        |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |

### FOOTNOTES

**COVID-19\***  
La cantidad de dosis recomendadas depende de la edad de su hijo y el tipo de vacuna contra el COVID-19 usada.

**Influenza\*\*** Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos 4 semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciban por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para algunos otros niños en este grupo de edad.

**VPH†** Todas las personas de entre 11 y 12 años deberían ponerse una serie de 2 dosis con un intervalo de entre 6 y 12 meses. Esta serie se puede comenzar cuando tengan 9 años. Se recomienda una serie de 3 dosis para las personas con el sistema inmunitario debilitado o que comiencen la serie después de haber cumplido los 15 años.

\*Edades recomendadas originalmente para las vacunas infantiles de rutina saltadas: serie de 2 dosis de la vacuna **MMR** (sarampión, paperas y rubéola) entre los 12 y 15 meses de edad, y entre los 4 y 6 años; serie de 2 dosis de la vacuna contra la **varicela** entre los 12 y 15 meses de edad, y entre los 4 y 6 años; serie de 2 dosis de la vacuna **HepA** (intervalo mínimo: 6 meses) entre los 12 y 23 meses de edad; serie de 3 dosis de la vacuna **HepB** entre 1 y 2 meses, y entre los 6 y 18 meses de edad; y una serie de 4 dosis de la vacuna contra la **poliomielitis** a los 2 meses, 4 meses, entre los 6 y 18 meses, y entre los 4 y 6 años.



**PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN**  
Llame a la línea telefónica gratuita: **1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)**  
O visite: [cdc.gov/vaccines/parents/index-sp.html](https://cdc.gov/vaccines/parents/index-sp.html)



# Las enfermedades y las vacunas que las previenen

ENTRE LOS 7 Y 18 AÑOS

| ENFERMEDAD  | VACUNA   | ENFERMEDAD PROPAGADA POR                     | SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD  | COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD  |
|---|--|--|--|--|
| <b>Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)</b> | La vacuna contra el <b>COVID-19</b> protege contra complicaciones graves por la enfermedad del coronavirus 2019. | Aire, contacto directo.                      | Puede no causar síntomas o causar fiebre, dolores musculares, dolor de garganta, tos, moqueo, diarrea, vómitos, pérdida reciente del gusto o del olfato.   | Neumonía (infección en los pulmones), insuficiencia respiratoria, trombos o coágulos de sangre, lesiones en el hígado, el corazón o los riñones, síndrome inflamatorio multisistémico, síndrome pos-COVID, muerte. |
| <b>Influenza (gripe)</b>                          | La vacuna contra la <b>influenza</b> protege contra esta enfermedad.   | Aire, contacto directo.                      | Fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, tos, fatiga extrema.  | Neumonía (infección en los pulmones), bronquitis, sinusitis (infección de los senos paranasales), infecciones de oído, muerte.   |
| <b>Tétanos</b>                                    | Las vacunas <b>Tdap*</b> y <b>Td**</b> protegen contra el tétanos.   | Exposición a través de cortes en la piel.    | Rigidez en el cuello y los músculos abdominales, dificultad para tragar, espasmos musculares, fiebre.  | Fractura de huesos, dificultad para respirar, muerte.  |
| <b>Difteria</b>                                   | Las vacunas <b>Tdap*</b> y <b>Td**</b> protegen contra la difteria.  | Aire, contacto directo.                      | Dolor de garganta, fiebre leve, debilidad, inflamación de los ganglios del cuello.   | Inflamación del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, coma, parálisis, muerte.   |
| <b>Tosferina (pertussis)</b>                      | La vacuna <b>Tdap*</b> protege contra la tosferina ( <i>pertussis</i> ).   | Aire, contacto directo.                      | Tos intensa, moqueo, apnea (interrupción de la respiración en los bebés).  | Neumonía (infección en los pulmones), muerte.  |
| <b>Virus del papiloma humano</b>                  | La vacuna contra el <b>VPH</b> protege contra el virus del papiloma humano.                                      | Contacto directo con la piel.                | Puede no causar síntomas o causar verrugas genitales.  | Cáncer de cuello uterino, vaginal, de vulva, de pene, anal, orofaríngeo.   |
| <b>Enfermedad meningocócica</b>                   | Las vacunas <b>MenACWY</b> y <b>MenB</b> protegen contra la enfermedad meningocócica.                            | Aire, contacto directo.                      | Aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza y rigidez de cuello, sarpullido oscuro de color morado.   | Pérdida de extremidades, sordera, trastornos del sistema nervioso, discapacidades del desarrollo, trastornos convulsivos, accidentes cerebrovasculares, muerte.  |
| <b>Sarampión</b>                                  | La vacuna <b>MMR†</b> protege contra el sarampión.   | Aire, contacto directo.                      | Sarpullido, fiebre, tos, moqueo, conjuntivitis.  | Encefalitis (inflamación del cerebro), neumonía (infección en los pulmones), muerte.   |
| <b>Paperas</b>                                    | La vacuna <b>MMR†</b> protege contra las paperas.  | Aire, contacto directo.                      | Inflamación de glándulas salivales (debajo de la mandíbula), fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular.   | Meningitis (infección de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal), encefalitis (inflamación del cerebro), inflamación de los testículos o los ovarios, sordera, muerte.                          |
| <b>Rubéola</b>                                    | La vacuna <b>MMR†</b> protege contra la rubéola.   | Aire, contacto directo.                      | A veces sarpullido, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos.  | Muy grave en las mujeres embarazadas: puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, defectos de nacimiento.   |
| <b>Varicela</b>                                   | La vacuna contra la <b>varicela</b> protege contra esta enfermedad.  | Aire, contacto directo.                      | Sarpullido, cansancio, dolor de cabeza, fiebre.  | Ampollas infectadas, trastornos hemorrágicos, encefalitis (inflamación del cerebro), neumonía (infección en los pulmones) muerte.  |
| <b>Hepatitis A</b>                                | La vacuna <b>HepA</b> protege contra la hepatitis A.   | Contacto directo, comida o agua contaminada. | Puede no causar síntomas o causar fiebre, dolor de estómago, pérdida del apetito, fatiga, vómitos, ictericia (coloración amarilla de la piel y los ojos), orina oscura.  | Insuficiencia hepática, artralgia (dolor en las articulaciones), trastornos de los riñones, del páncreas y de la sangre, muerte.   |
| <b>Hepatitis B</b>                                | La vacuna <b>HepB</b> protege contra la hepatitis B.   | Contacto con sangre o líquidos corporales.   | Puede no causar síntomas o causar fiebre, dolor de cabeza, debilidad, vómitos, ictericia (coloración amarilla de la piel y los ojos), dolor en las articulaciones.   | Infección crónica del hígado, insuficiencia hepática, cáncer de hígado, muerte.  |
| <b>Poliomielitis</b>                              | La vacuna <b>IPV</b> protege contra la poliomyelitis.  | Aire, contacto directo, por la boca.         | Puede no causar síntomas o causar dolor de garganta, fiebre, náuseas, dolor de cabeza.   | Parálisis, muerte.   |
| <b>Dengue</b>                                     | La vacuna contra el <b>dengue*</b> protege contra esta enfermedad.   | Picadura de un mosquito infectado.           | Puede no causar síntomas o causar fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, sarpullido, dolor en las articulaciones, dolores corporales, náuseas, pérdida del apetito, sentirse cansado, dolor abdominal. | Hemorragia intensa, convulsiones, <i>shock</i> , daño al hígado, al corazón o a los pulmones, muerte.  |

**Tdap\***

La vacuna Tdap combina la protección contra la difteria, el tétanos y la tosferina.

**Td\*\***

La vacuna Td combina la protección contra la difteria y el tétanos.

**MMR†**

La vacuna MMR combina la protección contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

**Dengue\***

Se recomienda en los lugares donde el dengue es común.

Última actualización en febrero del 2023  
CS22257-B • MLS 337794-A